

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: SANYTOL DEZINFEKČNÝ ZÁPACH FRESH

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie: SK20-012-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0016756-0008

Obsah

| | |
|--|----|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 2 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 2 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 2 |
| 2.2. Typ úpravy | 2 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 2 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 3 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 9 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 9 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 9 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 10 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 10 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 10 |
| 6. Ďalšie informácie | 10 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

| |
|----------------------------------|
| SANYTOL DEZINFEKČNÝ ZÁPACH FRESH |
|----------------------------------|

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

| | |
|------------|--|
| Názov/Meno | GRUPO AC MARCA S.L. |
| Adresa | Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španielsko |

Číslo autorizácie

| |
|---------------------|
| SK20-012-00-000 1-1 |
|---------------------|

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

| |
|-----------------|
| SK-0016756-0008 |
|-----------------|

Dátum autorizácie

| |
|------------|
| 22/06/2020 |
|------------|

Dátum skončenia platnosti autorizácie

| |
|------------|
| 19/02/2030 |
|------------|

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

| |
|---------------------|
| Grupo AC Marca S.L. |
|---------------------|

Adresa výrobcu

| |
|--|
| Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španielsko |
|--|

Miesto výrobných priestorov

| |
|---|
| Polígono Industrial Can Serra III, Parcela I 08791 Sant Llorenç d'Hortons- Barcelona Španielsko |
|---|

| |
|--|
| Polígono Industrial Can Barri. C/ Esqueis S/N 08415 Bigues i Riells Španielsko |
|--|

| |
|---|
| Jana Čermáka 124 282 01 Přešimasy Česká republika |
|---|

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|-----------------------------|---|
| Účinná látka | 1315 - peroxid vodíka |
| Meno/Názov výrobcu | PeroxyChem Spain s.l.u |
| Adresa výrobcu | C/ Afueras s/n 50784 La Zaida - Zaragoza Španielsko |
| Miesto výrobných priestorov | C/ Afueras s/n 50784 La Zaida - Zaragoza Španielsko |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|
| peroxid vodíka | | Účinná látka | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,5 |
| Ethanol | Ethanol | | 64-17-5 | 200-578-6 | 3 |
| L-(+)-lactic acid | 2- Hydroxy propanoic acid | | 79-33-4 | 201-196-2 | 0,49 |
| 1-Decanamine, N,N-dimethyl, N-oxide | N,N-Dimethyldecylamine N-oxide | | 2605-79-0 | 220-020-5 | 0,48 |
| D-pentose et D-glucose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides | D-pentose et D-glucose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides | | | 483-960-7 | 0,96 |
| 1-Deoxi-1-(metil-(C8-10-(numeración par)-alcanoil)amino)-D-Glucitol | 1-Deoxi-1-(metil-(C8-10-(numeración par)-alcanoil)amino)-D-Glucitol | | | 940-284-1 | 0 |

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

| |
|---|
| <p>Po manipulácii starostlivo umyte ruky</p> <p>Noste ochranné okuliare.</p> <p>PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</p> <p>Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.</p> |
|---|

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Tvrdý povrch PT 02

| | |
|--|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Tvrdý povrch |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <p>Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: -</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorne</p> <p>Interiér Na použitie v interiéri. Na použitie v komerčných priestoroch (potravinárske, priemyselné administratívne priestory), domácnosti/súkromné priestory (domáce priestory)</p> |
| Spôsob(y) aplikácie | <p>Manuálne striekanie - Manuálne striekanie a utieranie</p> |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | <p>-- 0 -</p> <p>Pripravené na použitie Doba pôsobenia: Baktérie: 5 minút Huby a kvasinky: 15 minút Teplota: 20 °C</p> |

Kategória(ie) používateľ'ov

Profesionálne
Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml
Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Manuálne nastriekanie a utretie na tvrdom povrchu: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 5 minút, aby sa dosiahla baktericídna účinnosť, a 15 minút, pokiaľ ide o účinok na kvasinky a huby. Povrch utrite navlhčenou a čistou handrou. Povrch nechajte vyschnúť.
Manuálne nastriekanie na tvrdý povrch: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 5 minút, aby sa dosiahla baktericídna účinnosť, a 15 minút, pokiaľ ide o účinok na kvasinky a huby. Povrch nechajte vyschnúť.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Tvrdý povrch PT 04

| | |
|--|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Tvrdý povrch |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <p>Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: -</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorne</p> <p>Interiér Na použitie v interiéri. Na použitie v komerčných priestoroch (potravínárske, priemyselné administratívne priestory), domácnosti/súkromné priestory (domáce priestory)</p> |
| Spôsob(y) aplikácie | <p>Manuálne striekanie - Manuálne striekanie a utieranie</p> |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | <p>-- 0 - Pripravené na použitie Doba pôsobenia: Baktérie: 5 minút Huby a kvasinky: 15 minút Teplota: 20 °C</p> |
| Kategória(ie) používateľov | <p>Profesionálne</p> <p>Široká verejnosť (neprofesionálne)</p> |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | <p>Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml</p> |

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Manuálne nastriekanie a utretie na tvrdom povrchu: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 5 minút, aby sa dosiahla baktericídna účinnosť, a 15 minút, pokiaľ ide o účinok na kvasinky a huby. Povrch utrite navlhčenou a čistou handrou. Povrch nechajte vyschnúť.

Manuálne nastriekanie na tvrdý povrch: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 5 minút, aby sa dosiahla baktericídna účinnosť, a 15 minút, pokiaľ ide o účinok na kvasinky a huby. Povrch nechajte vyschnúť.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Mäkký povrch PT 02

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Mäkký povrch

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie
Bežný názov: Baktérie
Vývojové štádium: -

Vedecký názov: Kvasinky
Bežný názov: Kvasinky
Vývojové štádium: -

Vedecký názov: Huby
Bežný názov: Huby
Vývojové štádium: -

Oblasti použitia

Vnútorne

Interiér
Na použitie v interiéri.
Na použitie v komerčných priestoroch (potravinárske, priemyselné administratívne priestory), domácnosti/súkromné priestory (domáce priestory)

| | |
|---|---|
| Spôsob(y) aplikácie | Manuálne nastriekanie - - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | -- 0 - Pripravené na použitie. Doba pôsobenia: Baktérie, huby a kvasinky: 45 minút Teplota: 20 °C |
| Kategória(ie) používateľov | Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml |

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Manuálne nastriekanie na mäkký povrch: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 45 minút.
Povrch nechajte vyschnúť.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

| |
|---|
| - |
|---|

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Mäkký povrch PT 04

| | |
|--|---|
| Typ výrobku | Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Mäkký povrch |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: - Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: - Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: - |
| Oblasti použitia | Vnútorne Interiér Na použitie v interiéri. Na použitie v komerčných priestoroch (potravinárske, priemyselné administratívne priestory), domácnosti/súkromné priestory (domáce priestory) |
| Spôsob(y) aplikácie | Manuálne nastriekanie - - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | -- 0 - Pripravené na použitie. Doba pôsobenia: Baktérie, huby a kvasinky: 45 minút Teplota: 20 °C |
| Kategória(ie) používateľ'ov | Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml |

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Manuálne nastriekanie na mäkký povrch: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali mokré najmenej 45 minút.
Povrch nechajte vyschnúť.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte štítok alebo písomnú informáciu pre používateľa a dodržiavajte všetky uvedené pokyny.

Pre odborných používateľov:
Pozrite si existujúci hygienický plán, aby ste sa uistili, že sa dosiahne potrebná úroveň účinnosti.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pre odborných používateľov:
Počas striekania sa musí obmedziť vystavenie tváre vytvoreným aerosólom použitím OOP a technických a organizačných RMM, ako napríklad:
minimalizácia špliechania a rozliatia,
aplikácia spreja smerom nadol, aby sa zabránilo expozícii tváre,
minimalizácia počtu exponovaných zamestnancov.
Počas striekania sa majú použiť nasledujúce OOP: ochranné okuliare.

Pre neodborných používateľov:
Aplikácia spreja sa musí vykonávať smerom nadol, aby sa zabránilo akémukoľvek vystaveniu tváre.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Vdýchnutie (postreková hmla): Postihnutého preneste na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá umožní pohodlné dýchanie. Ak sa vyskytnú príznaky a/alebo sa vdýchne veľké množstvo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zasiahnutie pokožky: Vyzlečte znečistený odev a obuv. Kontaminovanú pokožku umyte mydlom a vodou. Ak sa vyskytnú príznaky, kontaktujte odborníka na intoxikáciu.
Zasiahnutie očí: Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody, občas nadvihnite horné a dolné viečka. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou najmenej 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku starostlivosť.
Prehltnutie: Vypláchnite ústa vodou. Kontaktujte odborníka na intoxikáciu. Ak sa vyskytnú príznaky a/alebo sa vdýchne veľké množstvo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
V prípade porúch vedomia umiestnite postihnutú osobu do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte tekutiny ani nevyvolávajte zvracanie.
Majte k dispozícii nádobu alebo štítok.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nepoužitý produkt nevypúšťajte na zem, do vodných tokov, potrubí (umývadlo, toalety...) ani do kanalizácie.
Nepoužitý produkt, jeho obal a všetok ostatný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Čas použiteľnosti je dva roky.
Chráňte pred mrazom a svetlom.

6. Ďalšie informácie

Ak je ošetrovanie neúčinné, informujte držiteľa povolenia.