

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: JADE PASTE

Tipo(s) de producto: TP14 - Rodenticidas

TP14 - Rodenticidas

TP14 - Rodenticidas

Número de la autorización: ES/MR(NA)-2018-14-00131

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0004367-0000

Indice

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Información administrativa | 1 |
| 1.1. Nombre comercial del producto | 1 |
| 1.2. Titular de la autorización | 1 |
| 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas | 1 |
| 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s) | 1 |
| 2. Composición y formulación del producto | 2 |
| 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida | 2 |
| 2.2. Tipo de formulación | 2 |
| 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia | 2 |
| 4. Uso(s) autorizado(s) | 3 |
| 5. Instrucciones generales de uso | 10 |
| 5.1. Instrucciones de uso | 10 |
| 5.2. Medidas de mitigación del riesgo | 11 |
| 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente | 11 |
| 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase | 11 |
| 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento | 12 |
| 6. Información adicional | 12 |

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

| |
|------------|
| DUO PASTE |
| JADE PASTA |

1.2. Titular de la autorización

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Razón social y dirección del titular de la autorización | Razón social | LODI S.A.S. |
| | Dirección | Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francia |
| Número de la autorización | ES/MR(NA)-2018-14-00131 | |
| R4BP 3 Número de referencia de activo | ES-0004367-0000 | |
| Fecha de la autorización | 04/02/2014 | |
| Fecha de vencimiento de la autorización | 01/07/2024 | |

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del fabricante | CGB (Compagnie Generale des Biocides) LODI S.A. |
| Dirección del fabricante | Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francia 35390 Grand Fougeray, Francia |
| Ubicación de las plantas de fabricación | Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390 Grand Fougeray, Francia 35390 Grand Fougeray, Francia |

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sustancia activa | 12 - Bromadiolona |
| Nombre del fabricante | Pelgar International Ltd. |
| Dirección del fabricante | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Reino Unido |
| Ubicación de las plantas de fabricación | Prazska 280 02 Kolin República Checa |

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

| Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|
| Bromadiolona | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Sustancia activa | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,005 |

2.2. Tipo de formulación

| |
|-------------------------------|
| Cebo listo para su uso: pasta |
|-------------------------------|

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro | <p>Puede dañar al feto.</p> <p>Provoca daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas ...</p> |
| Consejos de prudencia | <p>Pedir instrucciones especiales antes del uso.</p> <p>No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p> <p>Lavarse . concienzudamente tras la manipulación.</p> <p>No comer, beber ni fumar durante su utilización.</p> <p>Llevar guantes.</p> |

Consultar a un médico en caso de malestar.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso 1 –Ratones y/o Ratas – personal profesional especializado –interior.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto | TP14 - Rodenticidas |
| Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | No relevante para rodenticidas |
| Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | <p>Nombre científico: Rattus norvegicus Nombre común: rata parda o de alcantarilla Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Rattus norvegicus Nombre común: rata parda o de alcantarilla Etapa de desarrollo: Juveniles</p> <p>Nombre científico: Mus musculus Nombre común: ratón común Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Mus musculus Nombre común: ratón común Etapa de desarrollo: Juveniles</p> <p>Nombre científico: Rattus rattus Nombre común: rata negra Etapa de desarrollo: Adults & Juvenils</p> |
| Ámbito de utilización | <p>Interior</p> <p>Interior</p> |
| Método(s) de aplicación | <p>Método: En portacebos / trampas Descripción detallada:</p> <p>Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.</p> |
| Dosis y frecuencia de aplicación | <p>Tasa de aplicación: Consultar cuadro:* Número y frecuencia de aplicación Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación:</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Ratones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestación alta: 20-30 g de cebo por punto de cebo cada 2 metros. - Infestación baja: 20-30 g de cebo por punto de cebo cada 5 metros. <p>Ratas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestación alta: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 5 metros. - Infestación baja: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 10 metros. |
| Categoría(s) de usuarios | Profesional especializado |
| Tamaños de los envases y material del envasado | <p>Tamaño mínimo de envase de 3 Kg. Número de bolsas individuales por envase: hasta 10kg. Gramos de cebo: bolsitas de té de 10g. Cartucho (PP) para pistola aplicadora de 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g. Portacebos precargados (PP, PS, PVC) con 20 o 30 g de cebo en cajas de cartón de hasta 5 kg. Material de envasado: cajas de cartón con recubrimiento interior (PE) o cubos (PP, PE).</p> |

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.
Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores.
Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión.
Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas.
No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para monitorizar la actividad de los roedores.
No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.

Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Cuando los portacebos se coloquen cerca de sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.
Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso 2- Ratones y/o Ratas – personal profesional especializado – alrededor de edificaciones

Tipo de producto

TP14 - Rodenticidas

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

No relevante para rodenticidas

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Rattus norvegicus
Nombre común: Brown rat
Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Rattus norvegicus
Nombre común: Brown rat
Etapa de desarrollo: Juveniles

Nombre científico: Mus musculus
Nombre común: House mouse
Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Mus musculus
Nombre común: House mouse
Etapa de desarrollo: Juveniles

Nombre científico: Rattus rattus
Nombre común: House rat
Etapa de desarrollo: Adults & Juvenils

Ámbito de utilización

Otro
Alrededor de edificaciones

Método(s) de aplicación

Método: En portacebos / trampas
Descripción detallada:
Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.

Aplicación directa del cebo listo para su uso en madrigueras.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Ver cuadro.* Número y frecuencia de aplicación
Dilución (%): 0
Número y frecuencia de aplicación:

Ratones:

- Infestación alta: 20-30 g de cebo por punto de cebo cada 2 metros.
- Infestación baja: 20-30 g de cebo por punto de cebo cada 5 metros.

Ratas:

- Infestación alta: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 5 metros.
- Infestación baja: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 10 metros.

Madrigueras: 60-100g de cebo por madriguera.

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

Tamaño mínimo de envase de 3 Kg.

Número de bolsas individuales por envase: hasta 10kg.

Gramos de cebo: bolsitas de té de 10g.

Cartucho (PP) para pistola aplicadora de 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g.

Portacebos precargados (PP, PS, PVC) con 20 o 30 g de cebo en cajas de cartón de hasta 5 kg.

Material de envasado: cajas de cartón con recubrimiento interior (PE) o cubos (PP, PE).



4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej.: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Retirar el producto sobrante al final del tratamiento (no aplicable cuando se autorice explícitamente el uso en madrigueras) Para madrigueras: colocar el cebo de modo que se minimice la exposición de especies no objetivo y niños. Cubra o bloquee las entradas de las madrigueras cebadas para reducir los riesgos de rechazo y derrame del cebo. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores. Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.

Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej.: ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua. Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

4.3 Descripción de uso

Uso 3 - Uso 3 - Ratas – personal profesional especializado – áreas abiertas y vertederos.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto | TP14 - Rodenticidas |
| Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | No relevante para rodenticidas |
| Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Nombre científico: Rattus norvegicus Nombre común: Brown rat Etapa de desarrollo: Adultos Nombre científico: Rattus norvegicus Nombre común: Brown rat Etapa de desarrollo: Juveniles Nombre científico: Rattus rattus Nombre común: rata negra Etapa de desarrollo: Adultos Nombre científico: Rattus rattus Nombre común: rata negra Etapa de desarrollo: Juveniles |
| Ámbito de utilización | Exterior Áreas abiertas y vertederos |
| Método(s) de aplicación | Método: En portacebos / trampas Descripción detallada: Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. Aplicación directa del cebo listo para su uso en madrigueras. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | Tasa de aplicación: Ver cuadro: * Número y frecuencia de aplicación Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación: Ratas: - Infestación alta: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 5 metros. - Infestación baja: 60-100 g de cebo por punto de cebo cada 10 metros. Madrigueras: 60-100g de cebo por madriguera. |

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

Tamaño mínimo de envase de 3 Kg.

Número de bolsas individuales por envase: hasta 10kg.

Gramos de cebo: bolsitas de té de 10g.

Cartucho (PP) para pistola aplicadora de 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g.

Portacebos precargados (PP, PS, PVC) con 20 o 30 g de cebo en cajas de cartón de hasta 5 kg.

Material de envasado: cajas de cartón con recubrimiento interior (PE) o cubos (PP, PE).

4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

*Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej.: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.
Retirar el producto sobrante al final del tratamiento (no aplicable cuando se autorice explícitamente el uso en madrigueras)
Para madrigueras: colocar el cebo de modo que se minimice la exposición de especies no objetivo y niños. Cubra o bloquee las entradas de las madrigueras cebadas para reducir los riesgos de rechazo y derrame del cebo.
Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.
Para los cebos en madrigueras:
Los cebos deben colocarse de manera que se minimice la exposición de especies no objetivo y niños.
Cubra o bloquee las entradas de las madrigueras para reducir los riesgos de rechazo y derrame del cebo.*

Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay).
Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas.

No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores.
No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.
Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej. Ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.
Ver este punto también en Instrucciones generales de uso

4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.

Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación.

Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.

El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.

El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...).

Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras

Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos (Ver sección 5.3. para ver la información que se debe incluir en la etiqueta).

Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el periodo de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios.

Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos.

Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo

No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación (el material del guante debe ser proporcionado por el titular de la autorización dentro de la información del producto).

Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto

La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación cebo.

Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.

No abrir la bolsita que contiene el cebo

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay).

La información del producto (ej: etiqueta y/o folleto) indicará claramente que el producto solo se suministrará a usuarios profesionales especializados que posean un certificado de capacitación. (ej: "solo para personal profesional especializado").

No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.

Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento.

No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente.

No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.

Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de :

- Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

Los portacebos deben etiquetarse con la siguiente información: "no mover o abrir"; "contiene un rodenticida"; "nombre del producto o número de autorización"; "sustancia(s) activa(s)"; "en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20)".

Peligroso para la fauna salvaje.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Se recomienda como método de tratamiento la incineración.

En la etiqueta de los portacebos se indicará lo siguiente:

- Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Para formulaciones de contacto (productos en gel o espuma):

- Al final del tratamiento elimínense las toallitas de limpieza a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.

El producto es estable durante 2 años

6. Información adicional

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en control rodenticida de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera personal profesional a aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.

Se considera personal no profesional al público en general que aplica el producto biocida en el ámbito de su vida privada.

Se considera uso interior de edificaciones, al interior de los edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o móviles, cuyos huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados.

Se considera uso alrededor de edificaciones, a lo largo del perímetro exterior de las edificaciones o instalaciones, (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebo y la edificación/instalación). También se incluyen aquí los aparcamientos que no entran en la definición de uso interior o de áreas abiertas, estaciones abiertas de autobuses o trenes, o zonas de puerto.

Se considera uso áreas abiertas a zonas como parques, campos de golf, aparcamientos abiertos y los alrededores de las tierras de cultivo, o de las estaciones o zonas de puerto.

Se considera uso en los medios de transporte al que se realiza en el interior del propio transporte (de mercancías y/o personas) y nunca en el exterior de los vehículos o en vehículos abiertos

Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben incorporar las siguientes precauciones de seguridad:

Las zonas tratadas deben estar señalizadas durante el periodo de tratamiento y junto a los portacebos debe figurar un aviso que explique el riesgo de envenenamiento primario o secundario provocado por el anticoagulante, y en el cual también se deberán

indicar las primeras medidas que deben tomarse en caso de envenenamiento.