

Sammendrag av produktegenskaper for et biocidprodukt

Produktnavn: Rodex Whole Wheat Bait

Produkttype(r): PT14 - Rottegift (skadedyrbekjempelse)

Godkjenningsnummer: NO-2014-0045

**R4BP 3-
asset_referansenummer:** NO-0005257-0000

Innholdsfortegnelse

Administrative opplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Innehaver av godkjenningen	1
1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)	1
1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)	2
2. Produktets sammensetning og formulering	2
2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Fare- og sikkerhetssetninger	2
4. Godkjent bruk	3
4.1.1 Bruksanvisning	4
4.1.2 Beskyttelsestiltak	4
4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis	5
4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje	5
4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold	5
5. Generell beskrivelse av bruk	5
5.1. Bruksanvisning	5
5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø	6
5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak	6
5.4. Avfallshåndtering	7
5.5. Oppbevaring og holdbarhet	7
6. Annen informasjon	7

Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

Tanaco Bromadiolon korn mod Mus og Rotte
Rodex Whole Wheat Pro

1.2. Innehaver av godkjenningen

Navn og adresse til innehaver av godkjenningen	Navn	PelGar International Limited
	Adresse	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Frankrike
Godkjenningsnummer	NO-2014-0045	
R4BP 3-asset_referansenummer	NO-0005257-0000	
Godkjenningsdato	19/11/2012	
Godkjenningens utløpsdato	19/03/2023	

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent	PelGar International Limited
Adresse til produsent	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Storbritannia
Adresse til produsentsted	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Storbritannia
	Doa Rat Bait Production Center, Mesokeleos street Palouriotissa, Nicosia Kypros
	Promedivet SRL, str. Lunga nr. 46/G 545500 SOVATA Romania

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

Aktivt stoff	12 - Bromadiolone
Navn på produsent	PelGar International Limited
Adresse til produsent	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Storbritannia
Adresse til produsentsted	Prazska 54 280 02 Kolin Tsjekkia

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivt stoff	28772-56-7	249-205-9	0.005
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivt stoff	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Formuleringstype

RB - Åte (klar til bruk)

3. Fare- og sikkerhetssetninger

Faresetninger

Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kan gi forsterskader.
Forårsaker organskader (blood) ved langvarig eller gjentatt eksponering ..

Sikkerhetssetninger

Innhent særskilt instruks før bruk.
Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
Ikke innånd støv.
Benytt vernehansker.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
Vask hender grundig etter bruk.
Ved eksponering eller mistanke om eksponering:Søk legehjelp.
Søk legehjelp ved ubehag.
Oppbevares innelåst.
Innhold til i samsvar med nasjonale forskrifter.

4. Godkjent bruk

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Mus og/eller rotter - godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon - innendørs	
Produkttype	PT14 - Rottegift (skadedyrbekjempelse)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant for rodenticider
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Mus musculus-husmus-Voksne og yngel Rattus norvegicus-Brunrotte-Voksne og yngel
Bruksområde	Innendørs Innendørs
Bruksmåte	Åtebehandling - Åte klar-til-bruk, til bruk i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr.

Bruksmengde og hyppighet

Mus: Opptil 40 g åte per åtestasjon. Dersom mer enn en åtestasjon er nødvendig, skal det være minimum 5 meter mellom åtestasjonene ved begrenset angrep og 2 meter ved omfattende angrep. Brunrotte: Opptil 200 g åte per åtestasjon. Dersom mer enn en åtestasjon er nødvendig skal det være minimum 10 meter mellom åtestasjonene ved begrenset angrep og minimum 5 meter ved omfattende angrep. - 100 -

Mus: Opptil 40 g åte per åtestasjon.

Ved omfattende angrep: Opptil 40 g åte per åtestasjon hver 2 meter

Ved begrenset angrep: Opptil 40 g åte per åtestasjon hver 5 meter .

Brunrotte: Opptil 200 g åte per åtestasjon.

Ved omfattende angrep: Opptil 200 g åte per åtestasjon hver 5 meter

Ved begrenset angrep: Opptil 200 g åte per åtestasjon hver 10 meter .

Brukerkategori(er)

Utdannet profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Kun godkjente skadedyrbekjempere:

Løst korn pakket i solide poser/bøtter/spann/esker. Hver pakning må inneholde minimum 3 kg åte.

Godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon:

Posjonspakninger (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g eller 200 g) som igjen er pakket i solide poser/bøtter/spann/esker. Hver pakning må inneholde minimum 3 kg åte.

Ferdigfylte åtestasjoner, flere åtestasjoner per pakning. Hver pakning må inneholde minimum 3 kg åte.

4.1.1 Bruksanvisning

-Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes.

-Følg eventuell ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Informert om mulig naboer og andre som kan bli berørt av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overensstemmelse med god etablert praksis].

-Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagernes inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep.

- For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis.

- Bruk ikke åtet til intervallutlegging.

stor sannsynlighet for nye angrep, når andre bekjempelsesmetoder har vist seg å være

utilstrekkelig.

- Permanent utlegging av åte er strengt begrenset til steder med

- I sammenheng med integrert skadedyrbekjempelse skal

strategien med permanent åteutlegging og vurdering av risiko for nye angrep vurderes fortløpende.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres i nærheten av avløpssystem.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se 'retningslinjer for bruk'.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se 'retningslinjer for bruk'.

5. Generell beskrivelse av bruk

5.1. Bruksanvisning

Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk.

- Før behandlingen påbegynnes skal det infiserte området undersøkes for å lokalisere hvor gnagerne er aktive, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker.
- Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn). Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagerne slik at de ikke spiser åtet.
- Produktet skal kun brukes som en del av en integrert bekjempelsesstrategi der også hygienerutiner og fysisk bekjempelse inngår.
- Produktet bør plasseres på steder der det tidligere har vært gnageraktivitet (f.eks. stier, bol, innhegninger, hull og huler).
- Åtestasjoner bør festes til underlaget dersom dette er mulig.
- Åtestasjoner skal være tydelig merket med at de inneholder gnagergift og at de ikke skal fjernes eller åpnes. (se avsnitt 5.3 for å se hvilke opplysninger som skal stå på etiketten).
- Dersom produktet brukes på offentlige steder bør de behandlede områdene merkes i behandlingsperioden. Sammen med åtestasjonen skal det settes oppslag om risikoen ved primær- eller sekundærforgiftning med et antikoagulant middel, samt en angivelse av førstehjelpstiltak ved forgiftning.
- Åtet må festes i åtestasjonen slik at det ikke kan flyttes av gnagerne.
- Plasser produktet slik at det er utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre dyr som åtet ikke er beregnet på.
- Ikke plasser åtet i nærheten av mat, drikke eller fôr, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, drikke eller fôr.
- Bruk hansker som beskytter mot kjemikalier ved håndtering av produktet (hanskematerialet angis i produktopplysningene av godkjenningssinnehaveren).
- Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produktet. Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet.
- Hyppigheten av inspeksjon av behandlede områder avgjøres av godkjent skadedyrbekjemper basert på vurderingen som ble foretatt før oppstart av bekjempelsen. Hyppigheten bør følge god etablert praksis.
- Dersom det spises lite av åtet sammenlignet med angrepets antatte omfang, bør det vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering.
- Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og gnageraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette fastslås.

Dersom andre årsaker kan utelukkes er det sannsynlig at årsaken er resistens i gnagerbestanden. Det bør da vurderes å bruke et ikke-antikoagulant gnagermiddel eller hvis mulig, et sterkere antikoagulant middel. Vurder også bruk av feller som alternativ bekjempelsesstrategi.

Åte i poser: Åpne ikke posen med åte.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

- Informer om mulig naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overenstemmelse med god etablert praksis].
- Produktopplysningene (dvs. etikett eller produktheft) skal tydelig vise at produktet kun skal utleveres til godkjente skadedyrbekjempere, ved fremvisning av sertifikat.
- Må ikke brukes i områder der det er mistanke om resistens mot det aktive stoffet i produktet.
- Produktene må ikke brukes i mer enn 35 dager uten å evaluere angrepets status og behandlingens effekt.
- For å forebygge resistens må det ikke byttes til et antikoagulerende middel med tilsvarende eller lavere styrke. Ved bytte av produkter bør det vurderes å bruke et ikke-antikoagulant middel, eller hvis tilgjengelig, en mer potent antikoagulant.

Ikke vask åtestasjoner eller redskaper med vann mellom behandlingene.

Døde gnagere skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig og kastes i restavfallet.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

- Dette produktet inneholder et antikoagulerende stoff. Ved inntak kan det forekomme forsinkede symptomer, som neseblod og blødende tannkjøtt. I alvorlige tilfeller kan blodutredelser/blåmerker eller blod i urin/avføring forekomme.

- Motgift: Vitamin K1; må kun gis av lege/veterinær.

Dersom produktet:

- kommer i kontakt med huden; vaskes huden med vann og deretter med såpevann.

- kommer i kontakt med øynene; skyll med øyeskyllevæske eller vann. Skyll mens øynene holdes åpne i minst 10 minutter.

- kommer inn i munnen; skyll munnen grundig med vann.

Gi aldri en bevisstløs person mat eller drikke.

Oppsøk straks lege dersom produktet svelges. Vis produktets emballasje eller etikett.

Kontakt dyrlege, dersom et kjæledyr har spist produktet.

Åtestasjoner skal merkes med følgende informasjon: "Må ikke fjernes eller åpnes", "Inneholder muse- eller rottegift", "Produktnavn eller godkjenningsnummer", "Aktiv stoff(er)", og "ved mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00)."

- Farlig for dyreliv.

5.4. Avfallshåndtering

Når bekjempelsen avsluttes skal resterende åte og emballasje leveres til godkjent avfallsmottak.
Emballasje uten rester av muse-/rottegift kan leveres til gjenvinning.
Det anbefales å buke hansker.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.
- Holdbarhet: 2 år

6. Annen informasjon

På grunn av den forsinkede virkemekanismen tar det 4-10 dager etter inntak av det antikoagulante rodenticidet for å oppnå effekt.
Gnagere kan være sykdomsbærere.
Berør ikke døde gnagere med bare hender; bruk hansker eller redskap som f.eks. tang eller klype til å fjerne dem.
- Dette produktet inneholder et bitterstoff og et fargestoff.

Korrekt setning for P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

På etiketten for produkter med løst korn skal følgende setning påføres: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere"
På etiketten for produkter med posjonspakninger/ferdigfylte åtestasjoner skal følgende setning påføres: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autoirsasjon".

For Miljødirektoratet:
Fornyet godkjenning 11.07.2018
Adm endring (tilleggsnavn): 07.09.2018
Revidert 10.12.2018