

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-AV033376-24 για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **Ratigen Wax Block** σχετικά με την προσθήκη της χρήσης του σκευάσματος σε υπονόμους,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Ratigen Wax Block** ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0055

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

18/04/2016

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

IMPEX EUROPA, S.L.

Avda. de Pontevedra Nº 39, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedrā, Ισπανία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην τοπική αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

4. Διανόμεας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd
T.K. 24839, 1304 Λευκωσία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Ratigen Wax Block

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους

Δραστική ουσία:

brodifacoum 0,005% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: IMPEX EUROPA, S.L., Ισπανία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 99,2% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: ACTIVA S.r.l., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία: 29/10/2018



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Ratigen Wax Block

Αρ. Έδειας: KY-0055

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Ratigen Wax Block	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	IMPEX EUROPA, S.L.
	Διεύθυνση	Avda. de Pontevedra Nº 39, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra, Ισπανία
Αριθμός άδειας	KY-0055	
Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας	18/04/2016	
Ημερομηνία λήξης άδειας	31/08/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	IMPEX EUROPA, S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Avda. de Pontevedra Nº 39, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra, Ισπανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Pol. Ind. de Trabanca Badiña, parcelas 22-24, 36600 Villagarcia de Arosa-Pontevedra, Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Activa s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre, 32, 20132 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR), Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	-	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB-Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση

Κατηγορία κινδύνου	-
Δηλώση επικινδυνότητας	H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.. P220 Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P314 Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατηρήσεις	Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Επαγγελματική χρήση – Μέσα/Γύρω από τα κτήρια

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά. Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα.</p> <p>Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.</p> <p>Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Μέθοδος εφαρμογής	<p><u>Δολωματική εφαρμογή</u></p> <p>Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς.</p> <p>Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p> <p>Απευθείας εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος μέσα στην τρύπα.</p> <p><u>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:</u> Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14</p>

	<p>μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200gρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 50gρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κηρώδεις κύβους των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP φάκελο/σακούλα ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500g 540,,600, 800G και 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 20, 7 και 25kg. <p>Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η Φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</p>

Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση – Υπαίθρια χρήση και Χωματερές

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Για υπαίθρια χρήση σε χωματερές.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά. Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Για υπαίθρια χρήση σε χωματερές.</p> <p>Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στην τρύπα.</p> <p>Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.</p> <p>Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.</p>
Μέθοδος εφαρμογής	<p><u>Δολωματική εφαρμογή</u></p> <p>Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς.</p> <p>Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p> <p>Απευθείας εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος μέσα στην τρύπα.</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου: Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η έκθεση σε παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του</p>

	<p>δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.</p> <p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής.</p> <p>Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κηρώδεις κύβους των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP σακούλα/φάκελο ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, 800G και 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 20, 7 και 25kg. <p>Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».</p>

Πίνακας 3. Επαγγελματική χρήση – Σε υπονόμους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
------------------------	----------------------

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για χρήση σε υπονόμους από επαγγελματίες. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Δολωματική εφαρμογή</u> Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένα / προστατευμένα σημεία δόλωσης. Το δόλωμα τοποθετείται ανά θέση σε υπάρχουσες κατασκευές ώστε να εξασφαλίσετε ότι το δόλωμα δεν θα παρασυρθεί με το νερό. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των δολωμάτων και αντικατάσταση όσων έχουν καταναλωθεί ή καταστραφεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Να γίνεται επανάληψη του προγράμματος σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής. Σε αποχετεύσεις, τοποθετήστε 200 g έως 300 g μπλοκ κάθε 30-50 m (ποτέ πάνω από 300 g σε κάθε φρεάτιο).
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Σε αποχετεύσεις, τοποθετήστε 200 g έως 300 g μπλοκ κάθε 30-50 m (ποτέ πάνω από 300 g σε κάθε φρεάτιο). Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά 3-6 μήνες. Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως έως 6 εβδομάδες.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά σε κηρώδεις κύβους των 5,10, 15, 20, 25, 30, 50, 90 και 100g, στις ακόλουθες συσκευασίες: <ul style="list-style-type: none"> • PE ή PP σακούλα/φάκελο ή χάρτινη Kraft σακούλα με εσωτερική στρώση PE ή PP των 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600 και 800g 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Χάρτινο κιβώτιο με εσωτερική στρώση PE ή PP των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500, 540, 600, και 800g και 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25kg. • Κουβάδες HDPE των 100, 150, 200, 250, 260, 300, 360, 400, 500g 540, 600, 800G και 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 20, 7 και 25kg.

Στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή».

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Διεξάγετε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη προσβεβλημένη περιοχή και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή παρά μόνο πριν τη εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι, φωλιές, τροφές, τρύπες, αυλάκια κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλα σημεία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά πλαστικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

-Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στη κρίση του επαγγελματία χρήστη, και εξαρτάται από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

-Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το διαφαινόμενο μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των δολωματικών σημείων σε άλλες θέσεις και τη πιθανότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.

-Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.

-Μην τοποθετείτε σταθμούς δόλωσης κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

-Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του

-Αφαιρέστε το εναπομείναν δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

-Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.

-Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.

-Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέρα των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση του επιπέδου προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ή των μόνιμων εφαρμογών με δόλωμα υπό ορισμένες συνθήκες.

-Για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας, να μην γίνεται η εναλλαγή των αντιπηκτικών σκευασμάτων με αντίστοιχη ή ασθενέστερη δραστικότητα. Για εναλλασσόμενη χρήση εξετάστε την πιθανότητα, εάν υπάρχει, ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού σκευάσματος.

-Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιήθηκε σαν δολωματικός σταθμός με νερό μεταξύ εφαρμογών.

-Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Ευρύ Κοινό

-Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (ανοίξτε τρύπες, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν)

-Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμη λύση (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά

-Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ετικέτα και / ή το φύλλο οδηγιών) πρέπει να καταστούν

σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας μειωμένης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (δηλαδή παρατηρείται ακόμα δραστηριότητα τρωκτικού), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσετε μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.

-Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.

-Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Η βρωδιφακούμη (brodifacoum) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβιας) για αρκετές εβδομάδες.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σε περίπτωση:

- Επαφής με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με κατάλληλο υγρό ή νερό, κρατήστε τα μάτια ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα στο άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
- Επικινδυνό για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Απορρίψτε τη συσκευασία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φώς.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής

-Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.