

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: RATIBROM 2 PASTE

Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control)

Authorisation number: 1670-3

R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Table Of Contents

| | |
|---|---|
| Administrative information | 1 |
| 1.1. Trade names of the product | 1 |
| 1.2. Authorisation holder | 1 |
| 1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products | 1 |
| 1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s) | 1 |
| 2. Product composition and formulation | 2 |
| 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product | 2 |
| 2.2. Type of formulation | 2 |
| 3. Hazard and precautionary statements | 2 |
| 4. Authorised use(s) | 2 |
| 4.1.1 Use-specific instructions for use | 4 |
| 4.1.2 Use-specific risk mitigation measures | 4 |
| 4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid | 5 |
| 4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its | 5 |
| 4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under | 5 |
| 5. General directions for use | 6 |
| 5.1. Instructions for use | 6 |
| 5.2. Risk mitigation measures | 6 |
| 5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to | 6 |
| 5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging | 6 |
| 5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage | 6 |
| 6. Other information | 6 |

Administrative information

1.1. Trade names of the product

| |
|------------------|
| Ratibrom 2 Paste |
|------------------|

1.2. Authorisation holder

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| Name and address of the authorisation holder | Name | Kollant S.r.l. |
| | Address | via trieste, 49/53 35121 Padova Italy |
| Authorisation number | 1670-3 | |
| R4BP 3 asset reference number | BG-0009959-0000 | |
| Date of the authorisation | 06/12/2013 | |
| Expiry date of the authorisation | 31/08/2020 | |

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

| | |
|--|--------------------------------|
| Name of the manufacturer | Kollant S.r.l. |
| Address of the manufacturer | Via Trieste 49/53 Padova Italy |
| Location of manufacturing sites | Via Trieste 49/53 Padova Italy |

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

| | |
|--|------------------------------------|
| Active substance | 12 - Bromadiolone |
| Name of the manufacturer | Activa S.r.l. |
| Address of the manufacturer | via Feltre № 32 20132 milano Italy |
| Location of manufacturing sites | via Feltre № 32 20132 milano Italy |

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

| Common name | IUPAC name | Function | CAS number | EC number | Content (%) |
|--------------|------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| Bromadiolone | | Active Substance | 28772-56-7 | 249-205-9 | 96.9 |

2.2. Type of formulation

RB - Bait (ready for use)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

Precautionary statements

Keep out of reach of children.

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - rodenticides

Product type

PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста, в предварителна опаковка (саше) от 20 g, за контрол числеността на гризачи – плъхове и мишки. Приложение за масова употреба: в и около жилищни сгради, включително прилежащи към тях дворове и градини, мазета, гаражи, килери, селскостопански сгради. Приложение за професионална употреба: в и около жилищни и селскостопански сгради, индустриални зони, складове, трюмове на кораби, железопътни вагони и складове, сгради с обществено предназначение, мазета, гаражи, килери, паркове и градини, животновъдни ферми, сметища и други открити площи.

Target organism(s) (including development stage)

Mus musculus-Brown rat-Adults

Field(s) of use

Indoor

Outdoor

Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на паста, в предварителна опаковка (саше) от 20 g, за контрол числеността на гризачи – плъхове и мишки.

Приложение за масова употреба: в и около жилищни сгради, включително прилежащи към тях дворове и градини, мазета, гаражи, килери, селскостопански сгради.

Приложение за професионална употреба: в и около жилищни и селскостопански сгради, индустриални зони, складове, трюмове на кораби, железопътни вагони и складове, сгради с обществено предназначение, мазета, гаражи, килери, паркове и градини, животновъдни ферми, сметища и други открити площи.

Application method(s)

Bait application -

За професионална и масова употреба. Готовата родентицидна примамка се поставя в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии да се поставят в засегнатите от гризачи, зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат, на места, недостъпни за деца, домашни животни и други нецелеливи животни. Дератизационните кутии в сформираните отровни точки са в брой и разположение, в зависимост от площите на засегнатите зони и плътността на заселване.

Application rate(s) and frequencies

40 - 100 g - 96.9 -

Норми за приложение за професионална и масова употреба: За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба: Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеливи животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно

действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

Category(ies) of users

Professional

General public (non-professional)

Pack sizes and packaging material

Bag /Sack - Paper, cardboard - 20 g - 25 kg

4.1.1 Use-specific instructions for use

Норми за приложение за професионална и масова употреба За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеливи животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Норми за приложение за професионална и масова употреба За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеливи животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да

се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антidot – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Норми за приложение за професионална и масова употреба: За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба: Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антidot – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Норми за приложение за професионална и масова употреба: За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба: Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антidot – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Норми за приложение за професионална и масова употреба: За домашна мишка – 40 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. За сив плъх – 60 g на 10 m², в дератизационна кутия, при по-голяма плътност на заселване, до 100 g на 10 m², в зависимост от плътността на заселване. Отровните точки с дератизационните кутии се проверяват и презареждат през 5-7 дни в случаи на консумация, повредена или замърсена примамка, до спиране на консумацията и липсата на активност на гризачите. Инструкции за безопасна употреба: Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелесъобразни животни. Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи,

кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите нормативни разпоредби. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. Антидот – витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

5.2. Risk mitigation measures

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

6. Other information

